

El condado de Deschutes confirma un caso de peste humana en un residente local

Los Servicios de Salud del Condado de Deschutes han confirmado un caso de peste humana en un residente local. Es probable que el individuo haya sido infectado por su gato sintomático.

"Todos los contactos cercanos del residente y su mascota han sido contactados y se les han proporcionado medicamentos para prevenir enfermedades", dijo el Dr. Richard Fawcett, Oficial de Salud del Condado de Deschutes.

Los síntomas de la peste generalmente comienzan en los seres humanos de dos a ocho días después de la exposición a un animal infectado o pulga. Estos síntomas pueden incluir la aparición repentina de fiebre, náuseas, debilidad, escalofríos, dolores musculares y/o ganglios linfáticos visiblemente inflamados llamados bubones.

Si no se diagnostica a tiempo, la peste bubónica puede progresar a peste septicémica (infección del torrente sanguíneo) y/o peste neumónica (infección pulmonar). Estas formas de peste son más graves y difíciles de tratar. Afortunadamente, este caso fue identificado y tratado en las primeras etapas de la enfermedad, lo que representa poco riesgo para la comunidad. No han surgido nuevos casos de peste durante la investigación de la enfermedad transmisible.

Según la Autoridad de Salud de Oregon, la peste es rara en Oregon, y el último caso se reportó en 2015. Se transmite a humanos o animales a través de la picadura de una pulga infectada o por contacto con un animal enfermo con la enfermedad. Los animales más comunes que transmiten la peste en el centro de Oregon son las ardillas y las ardillas rayadas, pero los ratones y otros roedores también pueden ser portadores de la enfermedad.

Consejos para prevenir la propagación de la peste:

- Evite todo contacto con roedores y sus pulgas. Nunca toque roedores enfermos, heridos o muertos.
- Mantenga a las mascotas con correa cuando estén al aire libre y protéjalas con productos para el control de pulgas. No permita que las mascotas se acerquen a roedores enfermos o muertos ni exploren madrigueras de roedores.

- Los gatos domésticos son muy susceptibles a la peste, y los gatos infectados pueden transmitir la bacteria a los humanos. Si es posible, desaliente la caza de roedores. Consulte a un veterinario de inmediato si su gato se enferma después de estar en contacto con roedores.
- Los residentes deben mantener a los roedores salvajes fuera de las casas y retirar la comida, las pilas de leña y otros atrayentes para los roedores alrededor de las casas y dependencias.
- No acampe, duerma ni descansa cerca de madrigueras de animales o áreas donde se observen roedores muertos.
- Absténgase de alimentar a ardillas, ardillas rayadas u otros roedores salvajes en campamentos y áreas de picnic. Guarde los alimentos y la basura en recipientes a prueba de roedores.
- Use pantalones largos metidos dentro de las botas para reducir la exposición a las pulgas. Aplique repelente de insectos en los calcetines y los puños de los pantalones para ayudar a reducir la exposición a las pulgas.

Contactos para los medios:

Emily Horton - 458-292-6024 emily.horton@deschutes.org

Jonathan Modie, OHA, 971-246-9139, PHD.Communications@oha.oregon.gov